

Til

NN

NORSK
DIABETES
REGISTER
for voksne

Årsrapport 2018

Diabetes mellitus rammer 4 % av den norske befolkningen, og forekomsten av type 2-diabetes er økende. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene til drøyt 4 milliarder kroner, der det meste brukes til behandling av senkomplikasjoner. Moderne diabetesbehandling, som vektlegger både å senke glukosenivået og å behandle den økte risikoen for hjerte- og karsykdommer, vil i betydelig grad redusere lidelse, komplikasjoner og kostnader.

Et bedre liv med diabetes

ÅRSRAPPORT 2018

Rapporten baserer seg på innsendte data fra Noklus diabeteskjema for 2018. Rapporten delt inn slik at første del av rapporten omhandler listepasienter med type 2-diabetes, mens andre del av rapporten omhandler listepasienter med type 1-diabetes.

Rapporten er delt i fem hovedavsnitt med tabeller og kortfattede kommentarer: Demografi, prosedyrer, behandling, måloppnåelse og komplikasjoner. Kommentarene er basert på nasjonale kliniske retningslinjer for diabetesområdet (www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-diabetes). Ved behov for detaljert informasjon bør du slå opp i retningslinjene.

I rapporten vil data fra dine listepasienter med type 2-diabetes sammenstilles med data fra 511 allmennleger og 12295 diabetespasienter og dine listepasienter med type 1-diabetes vil sammenstilles med data fra 108 allmennleger og 672 diabetespasienter. Bare leger som har rapportert inn data fra relativt mange av sine pasienter er med i sammenligningsgrunnlaget.

Det var 0 av dine pasienter med type 2 diabetes som var nydiagnostisert i 2018.

I tabellene kommer dine tall først (grønne kolonner), deretter kollegafordelingen (hvite kolonner). Denne fordelingen er vist med **gjennomsnitt og prosentiler** (persentiler), dvs. at tallene fra kollegene er rangordnet fra "færrest" til "flest". Dersom din verdi ligger mellom 10- og 90-prosentilen, er du med i de "midterste" 80 prosentene av fordelingen, dvs. at 10 % av deltakerne har lavere verdier enn 10-prosentilen, og 10 % har høyere verdier enn 90-prosentilen

Alle allmennleger som har sendt inn registreringer, får tilbakemelding. Dersom få pasienter har samtykket eller mange skjemaer er ufullstendig utfylt, vil rapporten selvsagt i mindre grad gi inntrykk av din praksis. **Manglende data er markert med en strek i tabellene.**

Vi tror alle vil ha nytte av å gå gjennom rapporten, gjerne sammen med en eller flere kolleger som har brukt diabeteskjemaet.

Med vennlig hilsen,

John Cooper

Medisinsk leder Norsk diabetesregister for voksne/
Endokrinolog

Sverre Sandberg

Leder Noklus

Karianne Fjeld Løvaas

Seksjonsleder Norsk diabetesregister for voksne

Geir Thue

Seksjonsleder Noklus/ Fastlege

Pasienter med type 2-diabetes

Del 1 – Demografi

Nedenfor finner du noen nøkkeltall og aldersfordeling for listepasienter med type 2-diabetes. Sammenligningsgrunnlaget er 511 allmennleger og 12295 diabetespasienter.

Tabell 1: Nøkkeltall.

Type 2-diabetes	Dine listepasienter	Alle praksiser	
		Gj.snitt	10-90 prosentiler
Antall pasienter	59	24	11-46
Prosentandel kvinner	32	43	23-70
Alder (gjennomsnitt)	69	67	62-71
Sykdomsvarighet i år (gjennomsnitt)	12	10	7,7-13

Tabell 2: Aldersfordeling. Diabetesregisteret mottar data for personer med diabetes som er 18 år og eldre. For personer ≥ 81 år gjelder andre behandlingsmål enn for "yngre".

Type 2-diabetes	Dine listepasienter		Alle praksiser	
	Antall pas.	% (n=59)	Gj.snitt (%)	10-90 prosentiler
Alder				
18-29	0	0,0	0,3	0,0-0,0
30-39	0	0,0	1,6	0,0-6,7
40-49	2	3,4	7,0	0,0-16
50-59	15	25	19	6,9-33
60-69	17	29	30	16-45
70-80	15	25	32	15-50
≥ 81 år	10	17	10	0,0-20

Del 2 – Prosedyrer

Retningslinjene anbefaler at måling av HbA1c, blodtrykk og vekt inngår i rutinekontrollene. En gang årlig bør det dessuten måles lipider og mikroalbumin i urin, gjøres kartlegging av røykevaner, undersøkelse av føtter og undersøkelse av øyebunn hos øyelege (ev. annethvert år hos velregulerte uten retinopati). Høyde og risiko for prematur koronarsykdom bør også være dokumentert i journalen.

Ulike forhold innebærer at det ikke er rimelig å forvente at dette er ført inn i diabeteskjemaet hos alle. HbA1c-måling, blodtrykksmåling, lipidmålingene, registrering av røykevaner, øyebunnsundersøkelse, høyde og vekt bør være dokumentert hos 90 %. Undersøkelse av føtter bør være dokumentert hos 70 %.

Ved alder over 80 år bør man vurdere indikasjonen for analyse av lipider og mikroalbumin ut fra relevansen for forebygging av senkomplikasjoner. For lipider er det derfor kun pasienter ≤ 80 år som er med i utvalget i tabell 3. Det samme gjelder kartlegging av prematur koronarsykdom i familien. For de andre variablene er alle pasientene med type 2 med i utvalget.

Når det gjelder lipider, brukes nå LDL-kolesterol i risikostratifiseringen fremfor ratio totalkolesterol/HDL-kolesterol.

Tabell 3: Prosentandel av type 2-diabetespasienter med prosedyrer dokumentert i Noklus diabeteskjema.

Type 2-diabetes	Dine listepasienter		Alle praksiser	
	Antall pas.	% (n=59)	Gj.snitt (%)	10-90 prosentiler
Måling av HbA1c	57	97	78	30-100
Måling av blodtrykk	56	95	94	82-100
Røykevaner angitt	59	100	96	88-100
Vekt angitt	56	95	92	78-100
Høyde angitt	59	100	96	88-100
Undersøkelse av fotpuls	54	92	81	38-100
Undersøkelse med monofilament og/eller stemmegaffel	54	92	82	40-100
Undersøkelse av øyebunn	43	73	63	33-86
		% (n=49)		
Kartlagt om det er prematur koronarsykdom i familien	47	96	90	73-100
Måling av total-kolesterol	45	92	87	62-100
Måling av HDL-kolesterol	45	92	83	53-100
Måling av LDL-kolesterol	45	92	86	60-100

* For HbA1c, blodtrykk, røykevaner, vekt og undersøkelser av føtter er kun data fra 1.10.2017-31.12.2018 tatt med (15 mnd tilbake). Måling av kolesterol/HDL/LDL og undersøkelse av øyebunn er tatt med dersom det foreligger svar fra 1.7.2016-31.12.2018 (30 mnd tilbake)

*Mikroalbumin er ikke med i tabellen pga av at benevnelse er lite standardisert i journalen og uttrekket til registeret er derfor mangelfullt.

Del 3 – Behandling

Behandlingen av diabetes retter seg som kjent mot å forebygge både mikro- og makrovaskulære komplikasjoner, og den medikamentelle behandlingen (effekten er godt dokumentert) blir derfor ofte ganske omfattende. I blodtrykkdelen av UKPDS-undersøkelsen¹ måtte en tredel av diabetespasientene behandles med tre eller flere blodtrykkssenkende medikamenter for å oppnå tilfredsstillende blodtrykk. Videre bør de fleste (ca. 75 %) av pasientene med type 2-diabetes tilbys behandling med statiner.

Tabell 4 gir en oversikt over prosentandelene av pasienter med type 2-diabetes som får:

- medikamenter mot hyperglykemi
- medikamenter mot hypertensjon
- medikamenter mot dyslipidemi
- tromboseprofylakse

Type 2-diabetes	Dine listepasienter		Alle praksiser	
	Antall pas.	% (n*)	Gj.snitt (%)	10-90 prosentiler
Hyperglykemi				
Bare kost og mosjon	12	20 (59)	20	4,0-38
Bare glukosesenkende medikamenter unntatt insulin	37	63 (59)	63	45-82
Insulin (ev. sammen med annen glukosesenkende behandling)	11	19 (59)	17	5,3-32
Hypertensjon				
Behandlet for hypertensjon	44	75 (59)	73	58-87
-herav med 1 medikament	16	36 (44)	30	13-50
-herav med 2 medikamenter	13	30 (44)	29	11-46
-herav med 3 eller flere medik.	15	34 (44)	41	19-63
Dyslipidemi				
Statiner	40	68 (59)	69	47-88
Tromboseprofylakse				
Acetylsalicylsyre/andre platehemmere (kjent hjerte- og karsykdom)	10	77 (13)	82	50-100
Antikoagulasjonsbehandling	7	12 (59)	8,8	0,0-18

* Fordi enkelte skjemaer kan være ufullstendig utfyllt, vil antallet (n) som grunnlag for prosentberegningen variere.

Del 4 – Måloppnåelse

Nasjonale retningslinjer anbefaler at de fleste personer med diabetes bør ha:

- Normal kroppsvekt. Det tilstrebes en vektreduksjon på minst 5-10 % ved overvekt ($KMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$) eller fedme ($KMI > 30 \text{ kg/m}^2$)
- HbA1c omkring 53 mmol/mol
- Systolisk blodtrykk (SBT) $\leq 135 \text{ mmHg}$
- Diastolisk blodtrykk (DBT) $\leq 85 \text{ mmHg}$
- LDL-kolesterol som er (jf. omtale under prosedyrer):
 - $\leq 2,5 \text{ mmol/L}$ hos pasienter uten kjent hjerte- og karsykdom
 - $\leq 1,8 \text{ mmol/L}$ hos pasienter med kjent hjerte- og karsykdom (i hovedsak koronar hjertesykdom og hjerneslag). Alle bør behandles med statiner.

Tabell 5: Måloppnåelse hos listepasienter med type 2-diabetes.


	Dine listepasienter		Alle praksiser	
Type 2-diabetes	Antall pas.	Gj.snitt	Gj.snitt	10-90 prosentiler
KMI (kg/m^2)	56	30	30	28-32
HbA1c (mmol/mol)	47	52	53	48-59
SBT (mmHg)	47	134	135	127-142
DBT (mmHg)	47	78	78	73-84
LDL-kolesterol (mmol/L)	45	2,5	2,6	2,2-3,1
Antall og prosentandel som har:	Antall pas.	% (n*)	Gj.snitt (%)	10-90 prosentiler
KMI ≤ 25	14	25 (56)	19	6,7-33
KMI 25,1-34,9	35	63 (56)	66	50-80
KMI ≥ 35	7	13 (56)	15	3,7-27
30 min. mosjon 0 ganger/uke	18	33 (55)	32	10-57
30 min. mosjon 1-2 ganger/uke	11	20 (55)	19	3,3-33
30 min. mosjon 3-4 ganger/uke	9	16 (55)	20	5,3-37
30 min. mosjon >4 ganger/uke	17	31 (55)	27	7,4-50
HbA1c $\leq 53 \text{ mmol/mol}$	36	63 (57)	58	33-80
HbA1c 54-64 mmol/mol	14	25 (57)	28	10-47
HbA1c 65-74 mmol/mol	4	7,0 (57)	8,5	0,0-20
HbA1c $\geq 75 \text{ mmol/mol}$	2	3,5 (57)	4,9	0,0-13
SBT $\leq 135 \text{ mmHg}$	33	59 (56)	56	33-81
SBT $\leq 135 \text{ mmHg}$ u/behandling	10	71 (14)	66	33-100
SBT $\leq 135 \text{ mmHg}$ m/behandling	23	55 (42)	52	29-81
DBT $\leq 85 \text{ mmHg}$	51	91 (56)	82	60-100
LDL med mål $\leq 2,5 \text{ mmol/L}$ (Pas. uten hjerte- og karsykdom) u/behandling	5	38 (13)	21	0,0-50
LDL med mål $\leq 2,5 \text{ mmol/L}$	17	71 (24)	62	33-92

(Pas. uten hjerte- og karsykdom) m/behandling				
LDL med mål $\leq 1,8$ mmol/L (Pas. med hjerte- og karsykdom)	3	38 (8)	37	0,0-80
Prosentandel dagligrøykere	6	10 (59)	16	5,6-28

* Fordi enkelte skjemaer kan være ufullstendig utfylt, vil antallet (n) som grunnlag for prosentberegningen variere. Gjennomsnittsverdiene er basert på siste resultat.

**Pasienter under som er eldre enn 80 år er ikke med i grunnlaget for HbA1c blodtrykk og LDL.

Figur 1: Oversikt over HbA1c-verdier i forhold til type blodsukkersenkende behandling for pasienter med type 2-diabetes sammenlignet med "alle praksiser".



Del 5 – Komplikasjoner

Tabell 6 viser forekomsten av viktige diabetes-komplikasjoner i din praksis.

Til sammenligning viser europeiske data fra 2002² at 72 % av pasienter med type 2-diabetes hadde minst én mikro- eller makrovaskulær komplikasjon og at 24 % hadde både mikro- og makrovaskulære komplikasjoner, for eksempel både retinopati og koronarsykdom. I en norsk undersøkelse med data fra 2004³ ble det funnet retinopati hos 20 %, kjent angina eller hjerteinfarkt hos 24 % og kjent hjerneslag/TIA hos 9 %. I diabetesskjemaet skal TIA ikke tas med under hjerneslag, og prosentandelen for hjernelag (alle praksiser) kan derfor synes høy, mens andelen med retinopati er lav og indikerer ufullstendig rapportering. I 2012 var diabetes den primære årsaken til nyreerstattende behandling (RRT) hos 30 pasienter med type 1-diabetes og 55 pasienter med type 2-diabetes. I tillegg hadde 82 pasienter (alle type-2 diabetes) med annen primær nyresykdom diabetes som co-morbiditet. Totalt hadde derfor 33 % av nye pasienter med behov for nyreerstattende behandling i 2012 diabetes (nefrologiregisteret, www.nephro.no).

Tabell 6: Registrerte komplikasjoner.

Type 2-diabetes	Dine listepasienter		Alle praksiser	
	Antall pas.	% (n*)	Gj.snitt (%)	10-90 prosentiler
Koronarsykdom	9	15 (59)	19	7,1-33
Hjerneslag	4	6,8 (59)	6,1	0,0-14
Amputasjon	0	0,0 (59)	0,4	0,0-0,0
Karkirurgi	1	1,7 (59)	2,3	0,0-7,7
Manglende fotpuls	10	17 (59)	8,3	0,0-22
Hatt sår nedenfor ankelen	0	0,0 (59)	1,9	0,0-6,7
Perifer nevropati	20	34 (59)	35	0,0-97
Ikke laserbehandlet retinopati	8	15 (55)	5,9	0,0-15
Laserbehandlet retinopati	1	1,8 (55)	1,4	0,0-5,6
Mikroalbuminuri	7	12 (57)	8,0	0,0-22
Proteinuri	1	1,8 (57)	2,5	0,0-8,3
Moderat nyresvikt, dvs. eGFR 30-59 (basert på kreatinin, alder og kjønn)	13	23 (57)	15	0,0-27
Alvorlig nyresvikt, dvs. eGFR<30 (basert på kreatinin, alder og kjønn)	0	0,0 (57)	1,1	0,0-4,3

* Fordi enkelte skjemaer kan være ufullstendig utfyllt, vil antallet (n) som grunnlag for prosentberegningen variere.

Referanser:

- (1) UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. *BMJ* 1998; 317(7160):703-713.
- (2) Williams R, Van GL, Lucioni C. Assessing the impact of complications on the costs of Type II diabetes. *Diabetologia* 2002; 45(7):S13-S17.
- (3) Jenssen TG, Tonstad, Claudi T, Midthjell K, Cooper J. The gap between guidelines and practice in the treatment of type 2 diabetes: A nationwide survey in Norway. *Diabetes Res Clin Pract.* 2008 May;80(2):314-20.

Pasienter med type 1-diabetes

Del 1 – Demografi

Nedenfor finner du noen nøkkeltall og aldersfordeling for listepasienter med type 1-diabetes. Sammenligningsgrunnlaget er 108 allmennleger og 672 diabetespasienter.

Tabell 7: Nøkkeltall.

Type 1-diabetes	Dine listepasienter	Alle praksiser	
		Gj.snitt	10-90 prosentiler
Antall pasienter	8	4,8	3,0-7,0
Prosentandel kvinner	25	42	0,0-75
Alder (gjennomsnitt)	52	55	45-67
Sykdomsvarighet i år (gjennomsnitt)	24	25	17-33

Tabell 8: Aldersfordeling. Diabetesregisteret mottar data for personer med diabetes som er 18 år og eldre.

Type 1-diabetes	Dine listepasienter		Alle praksiser	
	Antall pas.	% (n=8)	Gj.snitt (%)	10-90 prosentiler
Alder				
18-29	1	13	6,4	0,0-25
30-39	2	25	11	0,0-33
40-49	1	13	22	0,0-50
50-59	1	13	19	0,0-49
60-69	1	13	23	0,0-50
70-80	1	13	16	0,0-49
≥ 81 år	1	13	2,9	0,0-6,9

Del 2 – Prosedyrer

Retningslinjene anbefaler at måling av HbA1c, blodtrykk og vekt inngår i rutinekontrollene. En gang årlig bør det dessuten måles lipider og mikroalbumin i urin, gjøres kartlegging av røykevaner, undersøkelse av føtter og undersøkelse av øyebunn hos øyelege (ev. annethvert år hos velregulerte uten retinopati). Høyde og risiko for prematur koronarsykdom bør også være dokumentert i journalen.

Ulike forhold innebærer at det ikke er rimelig å forvente at dette er ført inn i diabeteskjemaet hos alle. HbA1c-måling, blodtrykksmåling, lipidmålingene, registrering av røykevaner, øyebunnsundersøkelse, høyde og vekt bør være dokumentert hos 90 %. Undersøkelse av føtter bør være dokumentert hos 70 %.

Ved alder over 80 år bør man vurdere indikasjonen for analyse av lipider og mikroalbumin ut fra relevansen for forebygging av senkomplikasjoner. For lipider er det derfor kun pasienter ≤ 80 år som er med i utvalget i tabell 9. Det sammen gjelder kartlegging av prematur koronarsykdom i familien. For de andre variablene er alle pasientene med type 1 med i utvalget.

Når det gjelder lipider, brukes nå LDL-kolesterol i risikostratifiseringen fremfor ratio total kolesterol/HDL-kolesterol.

Tabell 9: Prosentandel av type 1-diabetespasienter med prosedyrer dokumentert i Noklus diabeteskjema.

Type 1-diabetes	Dine listepasienter		Alle praksiser	
	Antall pas.	% (n=8)	Gj.snitt (%)	10-90 prosentiler
Måling av HbA1c	7	88	74	2,5-100
Måling av blodtrykk	6	75	95	75-100
Røykevaner angitt	8	100	96	83-100
Vekt angitt	6	75	91	67-100
Høyde angitt	8	100	96	100-100
Undersøkelse av fotpuls	6	75	82	50-100
Undersøkelse med monofilament og/eller stemmegaffel	6	75	83	35-100
Undersøkelse av øyebunn	4	50	76	33-100
		% (n=7)		
Kartlagt om det er prematur koronarsykdom i familien	7	100	91	75-100
Måling av LDL-kolesterol	5	71	77	33-100

* For HbA1c, blodtrykk, røykevaner, vekt og undersøkelser av føtter er kun data fra 1.10.2017-31.12.2018 tatt med (15 mnd tilbake). Måling av LDL og undersøkelse av øyebunn er tatt med dersom det foreligger svar fra 1.7.2016-31.12.2018 (30 mnd tilbake)

*Mikroalbumin er ikke med i tabellen pga av at benevnelse er lite standardisert i journalen og uttrekket til registeret er derfor mangelfullt.

Del 3 – Behandling

Tabell 10 gir en oversikt over prosentandelene av pasienter med type 1-diabetes som får:

- medikamenter mot hypertensjon
- medikamenter mot dyslipidemi
- tromboseprofylakse

Type 1-diabetes	Dine listepasienter		Alle praksiser	
	Antall pas.	% (n*)	Gj.snitt (%)	10-90 prosentiler
Hypertensjon				
Behandlet for hypertensjon	4	50 (8)	52	21-85
Dyslipidemi				
Statiner	5	63 (8)	56	25-80
Tromboseprofylakse				
Acetylsalicylsyre/andre platehemmere (kjent hjerte- og karsykdom)	0	0,0	40	0,0-100
Antikoagulasjonsbehandling	1	13 (8)	5,7	0,0-25

* Fordi enkelte skjemaer kan være ufullstendig utfyllt, vil antallet (n) som grunnlag for prosentberegningen variere.

Del 4 – Måloppnåelse

Nasjonale retningslinjer anbefaler at de fleste personer med diabetes bør ha:

- HbA1c på omkring 53 mmol/mol
- Systolisk blodtrykk (SBT) \leq 135 mmHg
- Diastolisk blodtrykk (DBT) \leq 85 mmHg
- LDL-kolesterol som er (jf. omtale under prosedyrer):
 - \leq 2,5 mmol/L hos pasienter uten kjent hjerte- og karsykdom
 - \leq 1,8 mmol/L hos pasienter med kjent hjerte- og karsykdom (i hovedsak koronar hjertesykdom og hjerneslag). Alle bør behandles med statiner.

Tabell 11: Måloppnåelse hos listepasienter med type 1-diabetes.

	Dine listepasienter		Alle praksiser	
Type 1-diabetes	Antall pas.	Gj.snitt	Gj.snitt	10-90 prosentiler
KMI	6	25	27	24-31
HbA1c (mmol/mol)	7	60	60	50-71
SBT (mmHg)	5	130	130	120-141
DBT (mmHg)	5	84	75	68-81
LDL-kolesterol (mmol/L)	5	2,9	2,7	2,0-3,4
Antall og prosentandel som har:	Antall pas.	% (n*)	Gj.snitt (%)	10-90 prosentiler
KMI \leq 25	2	33 (6)	31	0,0-67
KMI 25,1-34,9	3	50 (6)	60	30-100
KMI \geq 35	0	0,0 (6)	7,5	0,0-25
30 min. mosjon 0 ganger/uke	1	17 (6)	29	0,0-67
30 min. mosjon 1-2 ganger/uke	1	17 (6)	19	0,0-50
30 min. mosjon 3-4 ganger/uke	2	33 (6)	24	0,0-67
30 min. mosjon >4 ganger/uke	2	33 (6)	28	0,0-67
HbA1c \leq 53 mmol/mol	0	0,0 (7)	0,0	0,0-0,0
HbA1c 54-64 mmol/mol	5	71 (7)	35	0,0-75
HbA1c 65-74 mmol/mol	0	0,0 (7)	19	0,0-50
HbA1c \geq 75 mmol/mol	1	14 (7)	14	0,0-50
SBT \leq 135 mmHg	3	50 (6)	67	33-100
SBT \leq 135 mmHg u/behandling	2	50 (4)	78	36-100
SBT \leq 135 mmHg m/behandling	1	50 (2)	55	0,0-100
DBT \leq 85 mmHg	4	67 (6)	90	67-100
LDL med mål \leq 2,5 mmol/L (Pas. uten hjerte- og karsykdom) u/behandling	1	100 (1)	39	0,0-100
LDL med mål \leq 2,5 mmol/L	1	25 (4)	59	0,0-100

(Pas. uten hjerte- og karsykdom) m/behandling				
LDL med mål $\leq 1,8$ mmol/L (Pas. med hjerte- og karsykdom)	-	-(0)	36	0,0-100
Prosentandel dagligrøykere	0	0,0 (8)	13	0,0-33

* Fordi enkelte skjemaer kan være ufullstendig utfylt, vil antallet (n) som grunnlag for prosentberegningen variere. Gjennomsnittsverdiene er basert på siste resultat.

Del 5 – Komplikasjoner

I 2012 var diabetes den primære årsaken til nyreerstattende behandling (RRT) hos 30 pasienter med type 1-diabetes og 55 pasienter med type 2-diabetes. I tillegg hadde 82 pasienter (alle type-2 diabetes) med annen primær nyresykdom diabetes som co-morbiditet. Totalt hadde derfor 33 % av nye pasienter med behov for nyreerstattende behandling i 2012 diabetes (nefrologiregisteret, www.nephro.no).

Tabell 12 viser forekomsten av viktige diabeteskomplikasjoner i din praksis.

Type 1-diabetes	Dine listepasienter		Alle praksiser	
	Antall pas.	% (n*)	Gj.snitt (%)	10-90 prosentiler
Koronarsykdom	0	0,0 (8)	12	0,0-33
Hjerneslag	0	0,0 (8)	4,2	0,0-17
Amputasjon	0	0,0 (8)	1,5	0,0-0,0
Karkirurgi	0	0,0 (8)	2,7	0,0-0,0
Manglende fotpuls	1	13 (8)	7,4	0,0-27
Hatt sår nedenfor ankelen	0	0,0 (8)	3,6	0,0-17
Perifer nevropati	4	50 (8)	34	0,0-100
Ikke laserbehandlet retinopati	3	38 (8)	20	0,0-50
Laserbehandlet retinopati	1	13 (8)	13	0,0-40
Mikroalbuminuri	1	13 (8)	8,7	0,0-30
Proteinuri	1	13 (8)	2,0	0,0-4,4
Moderat nyresvikt, dvs. eGFR 30-59 (basert på kreatinin, alder og kjønn)	0	0,0 (7)	10	0,0-33
Alvorlig nyresvikt, dvs. eGFR<30 (basert på kreatinin, alder og kjønn)	0	0,0 (7)	0,8	0,0-0,0

* Fordi enkelte skjemaer kan være ufullstendig utfyllt, vil antallet (n) som grunnlag for prosentberegningen variere.